

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要卷一萬七百三十三

子部

欽定授時通考卷七十

農餘

畜牧一

書堯典日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾

傳乳化曰孳交接曰尾疏產生為乳胎孕為化孕產
必愛之故乳化曰孳鳥獸皆以尾交接故交接曰尾
又日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希草

傳夏時鳥獸毛羽希少改易革改也疏鳥獸冬毛最多春猶未脫故至夏始毛羽希少改易往前

又宵中星虛以殷仲秋厥民夷鳥獸毛毳

傳毳理也毛更生整理疏毳者毛羽美悅之狀故為理也夏時毛羽希少今則毛羽復生夏改而少秋更生多故言更生整理

又曰短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛

傳鳥獸皆生氄毳細毛以自溫焉疏氄毛謂附肉細

毛

詩小雅誰謂爾無羊三百維羣誰謂爾無牛九十其牯
傳黃牛黑脊曰牯

又爾羊來思其角濺濺爾牛來思其耳濕濕

傳聚其角而息濺濺然伺而動其耳濕濕然箋言此
者美畜產得其所

又或降於阿或飲於池或寢或訛

傳訛動也箋言此者美其無所驚畏也

又爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩靡之以肱畢來既升
傳矜矜兢兢以言堅彊也騫虧也崩羣疾也肱臂也
升升入牢也箋此言擾馴從人意也

周禮天官太宰之職以九職任萬民四曰數牧

又膳夫膳用六牲

註六牲馬牛羊鷄犬豕也

又庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物

註六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲鄭司農云

六獸麋鹿熊麇野豕兔六禽雁鵠鸚雉鳩鵠康成謂
獸人冬獻狼又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬
六禽於禽獻及六摯宜為羔豚犢麇雉鴈凡鳥獸未
孕曰禽

又牧人掌牧六牲而阜蕃其物

疏阜盛也蕃息也物謂毛物言使肥盛蕃息各有毛
物

又掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之

註鳥之可養使盛大蕃息者謂鵠鷺之屬疏鷺即今之鴨民間所畜故云焉

又祭祀共卵鳥

註其卵可薦之鳥疏鷄亦在焉

禮記月令季春之月合累牛騰馬遊牝於牧

註累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廐者其牝欲遊則就牧之牝而合之

又仲夏之月游牝別羣

註孕妊之欲止也

又則繫騰駒

註為其牝氣有餘相蹄齧也

又仲秋之月乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢膳肥
瘠察物色必比類量大小視長短皆中度

註於鳥獸肥充之時宜省羣牲也養牛羊曰芻犬豕
曰豢

爾雅釋獸馬八尺為駢牛七尺為犉羊六尺為羝羴五

尺為狔狗四尺為鵠雞三尺為鶡

註陽溝巨鶡古之名雞疏此別六畜絕大者名也

史記貨殖列傳烏氏保畜牧及衆拆賣求奇繒物間獻
遺戎王戎王什倍其價與之畜畜至用谷量馬牛

又塞之斥也唯喬姚已致馬千匹牛倍之羊萬頭粟以
萬鍾計

漢書卜式傳卜式河南人也以田畜為事入山牧十餘
年致羊千餘頭上書願輸家財助邊上使使問欲為官

乎式曰自少牧羊不習仕宦不願也歸復田牧復持錢
二十萬與河南太守以給徙民召拜為中郎上曰吾有
羊在上林中欲令子牧之式既為郎布衣草屣而牧羊
歲餘羊肥息上過其羊善之式曰非獨羊也治民亦猶
是矣以時起居惡者輒去母令欺羣上奇其言拜緱氏
令

齊民要術服牛乘馬量其力能寒溫飲飼適其天性如
不肥充繁息者未之有也

又陶朱公曰子欲速富當畜五特

牛馬猪羊驢五畜之特然畜特則速富之

術也

又諺曰羸牛劣馬寒食下

言其乏食瘦瘠春中必死

務在充飽調適

而已

又凡馬驢駒初生忌灰氣遇新爐者輒死

經雨者則不忌

四時類要凡驢馬牛羊收犢子駒羔法

常於市上伺候含重垂欲生輒

買取駒犢一百五十日羊羔六十日皆能自活不復藉乳孔母好堪為種產者因留之以為種惡者還賣不失本價生羸駒犢還更買懷子孕者一歲之中牛馬驢得兩番羊得四倍羊羔臘月正月生者留以作種餘月生

者剩而賣之用二萬錢為羊本必歲收千口所留之種
率皆精好與世絕殊不可同日而語之何必羔犢之饒
又羸酪之利也羔有死者皮好作裘
褥肉好作乾腊及作肉醬味又甚美

馬

詩鄘風秉心塞淵騋牝三千

集傳秉操塞實淵深也蓋人操心誠實而淵深則無
所為而不誠其致此富盛宜矣

又魯頌駟駒牡馬在坰之野薄言駟者有騶有皇有驪
有黃以車彭彭思無疆思馬斯臧

傳駟駟良馬腹幹肥張也垌遠野也箋必牧於垌野者避民居與良田也垌之牧地水草既美牧人又良飲食得其時則自肥健耳藏善也

周禮牧師掌牧地孟春焚牧中春通淫

註焚牧地以除陳生新草也中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也

又庾人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駢攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬

註九者皆有政教焉阜盛壯也杜子春云佚當為逸
鄭司農云馬三歲曰駢二歲曰駒散讀為中散大夫
之散謂牯馬耳毋令善驚也康成謂逸者用之不使
甚勞安其血氣也教駢始乘習之也攻駒制其蹄齧
者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串
習不復驚

爾雅膝上皆白惟鼻四散皆白驢四蹄皆白首前足皆
白驥後足皆白駒前右足白啟左白蹄後右足白驤左

白鼻駢馬白腹驪驪馬白跨驕白州驪尾本白騃尾白
駟駟額白額白達素縣面額皆白惟驪

疏此辨馬白色所在之異名也馬之膝上皆白者惟
鼻也骹膝下也四膝下皆白名驢蹄蹄也四蹄皆白
名首俗呼為踏雪馬言蹄白似踏雪也前兩足皆白
名驪後二足皆白名駒前右足白名啟前左足白名
蹄後右足白名驪後左足白名鼻駢馬赤色黑鬣馬
也若駢馬腹下白者別名驪驪黑也白跨股脚白也

謂黑馬髀間白名騮州竅也謂馬之白尻者名驪也
本根株也馬尾株白者名騶但尾毛白者名駮駮白
也額額也額有白毛今之戴星馬也其白自額下達
鼻莖者名縣其面額皆白者惟駮馬

又回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹第方在背闕廣
疏此別馬旋毛所在之名也回旋也膺胸也旋毛在
膺者名宜乘在肘後者名減陽幹膺也在膺者名第
方在背名闕廣

又逆毛居駝

註馬毛逆刺

又牡曰騊牝曰騊

疏別馬牝牡之異名也郭云今江東呼駝馬為騊騊
即草馬之名也

又駝白駝黃白騊駝馬黃脊騊駝馬黃脊騊青騊駝青
騊駝騊青騊駝騊駝騊駝白雜毛騊駝黃白雜毛騊陰白雜
毛騊蒼白雜毛騊駝白雜毛騊駝白馬黑鬣駝白馬黑脊

駮黑喙駮一目白睨二目白魚

疏此別馬毛色不純之異名也駮赤色也謂馬有駮處有白處者曰駮有黃處有白處者曰駮駮馬脊毛黃者名駮駮馬脊毛黃者名駮青毛黑毛相雜者名駮今之鐵駮也青駮駮駮郭云色有深淺斑駮隱顯名駮今之連錢駮毛色青黑而髦鬣繁多者名駮毛色黑白而復有雜毛相錯者名駮今謂之烏駮毛色黃白而復有雜毛者名駮今謂之桃華馬陰淺黑色

也毛淺黑而白兼雜毛者名駟今謂之泥驄蒼淺青也毛有淺青及白兼雜毛者名騅彤赤也毛赤白兼雜毛者名馭即今之赭白馬也白馬黑鬣者名駱白馬黑脣者名駮喙口也黑喙者名騶一目白者名矚二目白者名魚言似魚目也

相馬經馬頭為王欲得方目為丞相欲得光脊為將軍欲得強腹脇為城郭欲得張四下為令欲得長凡相馬之法先除三羸五駑乃相其餘大頭小頸一羸弱脊大

腹二羸小頸大蹄三羸大頭緩耳一駕長頸不折二駕短上長下三駕大髀短脅四駕淺骭薄騶五駕騶馬驪肩鹿毛闕黃馬驪駱馬皆善馬也馬生墮地無毛行千里溺舉一腳行五百里相馬不藏法肝欲得小耳小則肝小肝小識人意肺欲得大鼻大則肺大肺大則能奔心欲得大目大則心大心大則猛利不驚目四滿則朝暮健腎欲得小腸欲得厚且長腸厚則腹下廣方而平脾欲得小膝腹小則脾小脾小則易養望之大就之小

筋馬也望之小就之大肉馬也皆可乘致致瘦欲得見

其肉

謂前肩守肉

致肥欲得見其骨

骨謂頭顱

馬龍顱突目平脊

大腹脰重有肉此三事備者亦千里馬也水火欲得分

水火在鼻兩孔間也

上唇欲急而方口中欲得紅而有光此馬千

里馬上齒欲鈎鈎則壽下齒欲鋸鋸則怒頷下欲深下

唇欲緩牙欲去齒一寸則四百里牙劒鋒則千里嗣骨

欲廉如織杼而濶又欲長

頰下側八骨是

目欲滿而澤眶欲小

上欲弓曲下欲直素中欲廉而張

素鼻孔上

陰中欲得平

股下

主人欲小

股裏上近前也

陽裏欲高則怒

股中上之主人

額欲方而平

八肉欲大而明

耳下

元中欲深

耳下近牙

耳欲小而銳如削筒

相去欲促懸欲載中骨高二寸

懸中骨也

易骨欲直

眼下直下骨也

頰欲開赤長膺下欲廣一尺以上名曰挾

一作扶

尺能久

走鞅欲方

頰前

喉欲曲而深胸欲直而出

髀間前向

鳧間欲開

望視之如雙鳧頸骨欲大肉次之髻欲桎而厚且折季

毛欲長多覆肝肺無病

髮後毛是

背欲短而方脊欲大而抗

胸筋欲大

夾脊筋也

飛鳧見者怒

胸筋也

三府欲齊

兩髀及中骨也

尻

欲頹而方尾欲減本欲大脅筋欲大而窪名曰上渠能

久走龍翅欲廣而長升肉欲大而明髀外肉也輔肉欲大而

明前腳下肉腸欲充腔小臆腔季肋欲張短肋懸薄欲厚而緩腳腔

虎口欲開股肉腹下欲平滿善走名曰下渠日三百里陽

肉欲上而高起髀外近前髀欲廣厚汗溝欲深明直肉欲方

能久走髀後肉也輸一作翰鼠欲方直肉下也腠肉欲急髀裏也間筋

欲急短而減善細走輸鼠下筋機骨欲舉上曲如懸匡馬頭

欲高距骨欲出前間骨欲出前後白外鳧臨蹄骨也附蟬欲大

前後目

夜眼

股欲薄而博善能走

後髀前骨

臂欲長而膝本欲

起有力

前腳膝上句前

肘後欲開能走膝欲方而痺髀骨欲短

兩肩骨欲深名曰前渠怒蹄欲厚三寸硬如石下欲深

而明其後開如鷄翼能久走相馬從頭始頭欲得高峻

如削成頭欲重宜少肉如剝兔頭壽骨欲得大如縣絮

苞圭石

壽骨者髮所生處也

白從額上入口名俞膺一名的顱奴

乘客死主乘棄市大兇馬也馬眼欲得高眶欲得端正

骨欲得成三角睛欲得如懸鈴紫艷光目不四滿下唇

急不愛人又踐不健食目中縷貫瞳子者五百里下上
徹者千里眈亂者傷人目下而多白畏驚瞳子前後肉
不滿皆兇惡若旋毛眼眶上壽四十年值眶骨中三十
年值中眶下十八年在目下者不借睛却轉後白不見
者喜旋而不前目睛欲得黃目欲大而光目皮欲得厚
目上白中有橫筋五百里上下徹者千里目中白縷者
老馬子目赤眈亂齧人反眈者善奔傷人目下有橫毛
不利人目有火字在者壽四十年目偏長一寸三百里

目欲長大旋毛在目下名曰承泣不利人目中五采盡
具五百里壽九十年良多血氣也驚多赤青肝氣也走
多黃腸氣也材知多白骨氣也材多黑腎氣也驚用策
乃使訛也白馬黑目不利人目多白却視有態畏物喜
驚馬耳欲得相近而前豎小而厚一寸三百里三寸千
里耳欲得小而前竦耳欲得短殺者良植者驚小而長
者亦驚耳欲得小而促狀如斬竹筒耳方者千里如斬
筒七百里如鷄距者五百里鼻孔欲得大鼻頭文如王

火字欲得明鼻上文如王公五十歲如火四十歲如天
三十歲如小一十歲如今十八歲如四八歲如宅七歲
鼻如水文二十歲鼻欲得廣而方唇不覆齒少食上唇
欲得急下唇欲得緩上唇欲得方下唇欲得厚而多理
故曰脣如板鞮御者啼黃馬白喙不利人口中色欲得
紅白如火光為善財多氣良且壽即黑不鮮明上盤不
通明為惡材少氣不壽一曰相馬氣發口中欲見紅白
色如穴中看此皆老壽一曰口中欲正赤上理文欲使

通直勿令斷錯口中青者三十歲如虹腹下皆不盡壽

駒齒死矣口吻欲得長口中色欲得鮮好旋毛在物後

為御禍不利人刺芻欲竟骨端

刺芻者齒間肉

齒左右蹉不相

當難御齒不周密不久疾不滿不原不能久走一歲上

下生乳齒各二二歲上下生齒各四三歲上下生齒各

六四歲上下生成齒二

成齒皆背三入四方生也

五歲上下著成齒

四六歲上下著成齒六

兩相黃生區受麻子也

七歲齒兩邊黃各

缺區平受米八歲上下盡區如一受麥九歲下中央兩

齒白受米十歲下中央四齒白十一歲下六齒盡白十

二歲下中央兩齒平十三歲下中央四齒平十四歲下

中央六齒平十五歲上中央兩齒白十六歲上中央四

齒白

若看上齒依
下齒次第者

十七歲上中央六齒皆白十八歲上

中央兩齒平十九歲上中央四齒平二十歲上中央六

齒平二十一歲下中央兩齒黃二十二歲下中央四齒

黃二十三歲下中央六齒盡黃二十四歲上中央二齒

黃二十五歲上中央四齒黃二十六歲上中央六齒盡

黃二十七歲下中二齒白二十八歲下中四齒白二十

九歲下中盡白三十歲上中央二齒白三十一歲上中

央四齒白三十二歲上中盡白頸欲得脰而長頸欲得

重頷欲折胸欲出臆欲廣頸項欲厚而強迴毛在頸不

利人白馬黑毛不利人肩肉欲寧

寧者却也

雙鳧欲大而上

雙鳧胸兩
遂肉如鳧

脊欲得平而廣能負重背欲得平而方鞍下

有迴毛名負尸不利人從後數其脇肋得十者良凡馬

十一者二百里十二者千里過十三者天馬萬乃一有

耳

一云十三肋五百里十五肋千里也

腋下有迴毛名曰挾尸不利人左

脇有白毛直下名曰帶刀不利人腹下欲平有八字腹

下毛欲前向腹欲大而垂結脉欲多大道筋欲大而直

大道筋從腸下抵股者多

腹下陰前兩邊生逆毛入腸帶者行千里

一尺者五百里三封欲得齊如一

三封者即尻上三骨也

尾骨欲

高而垂尾本欲大尾下欲無尾汗溝欲得深尻欲多肉

莖欲得麤大蹄欲得厚而大踠欲得細而促髌骨欲得

大而長尾本欲大而張膝骨欲圓而長大如杯孟溝上

通尾本者躡殺人馬有雙腳脛亭行六百里迴毛起踠
膝是也脛欲得圓而厚裏肉生焉後腳欲曲而立臂欲
大而短骸欲小而長腕欲促而大其間纔容韉烏頭欲

高

烏頭後足外節

後足輔骨欲大

輔足骨者後足骸之後骨

後左右足白不

利人白馬四足黑不利人黃馬白喙不利人後左右足

白殺婦相馬視其四蹄後兩足白老馬子前兩足白駒

馬子白毛者老馬也四蹄欲厚且大四蹄顛倒若堅履

不可畜

齊民要術久步即生筋勞筋勞則發蹄痛凌氣

一曰生骨則發

癰腫一曰發蹄生癰也

久立則發骨勞骨勞則發癰腫久汗不乾

則生皮勞皮勞者驤而不振汗未善燥而飼飲之則生

氣勞氣勞者即驤而不起驅馳無節則生血勞血勞則

發強行何以察五勞終日驅馳舍而視之不驤者筋勞

也驤而不時起者骨勞也起而不振者皮勞也振而不

噴者氣勞也噴而不溺者血勞也筋勞者兩絆却行三

十步而已

一曰筋勞者輟起而絆之徐行三十里而已

骨勞者令人牽之起

從後答之起而已皮勞者夾脊摩之熱而已氣勞者緩
繫之櫪上遠餵草噴而已血勞者高繫無飲食之大溺
而已飲食之節食有三芻飲有三時何謂也一曰惡芻
二曰中芻三曰善芻

善芻飢時與惡芻飽時與善芻引
之令食食常飽則無不肥到草廩

雖是豆穀亦不肥充細判無節筴
而食之者令馬肥不啞自然好矣

何謂三時一曰朝飲

少之二曰晝飲則胸膈水三曰暮極飲之

一曰夏汗冬
寒皆當節飲

彥曰旦起騎穀日中騎水斯言旦飲須節水也每飲食
令行驟則消水小驟數百步亦佳十日一教令其陸梁
舒展令馬
硬實也

夏即不汗冬即不寒汗而極乾

便民圖看馬捷法頭欲高峻面欲瘦而少肉眼下無肉
多咬人胸堂欲濶肋骨過十二條者良三山骨欲平則
易肥四蹄欲注實則能負重腹下兩邊生逆毛到賺者
良

又馬者火畜也其性惡濕利居高燥之地日夜餵飼仲
春羣蓋順其性也季春必啗恐其遘也盛夏午間必牽
於水浸之恐其傷於暑也季冬稍遮蔽之恐其傷於寒
也啗以猪膽犬膽和料餵之欲其肥也餵料時須擇新

草篩簸豆料若熟料用新汲水浸淘放冷方可餵飼一
夜須二三次起餵草料若天熱時不宜加熟料止可用
豌豆大麥之類生餵夏月自早至晚宜飲水三次秋冬
只飲一次可也飲宜新水宿水能令馬病冬月飲畢亦
宜緩騎數里卸鞍不宜當簷下風吹則成病

飼父馬令不鬪法

多有父馬者別作一坊多置槽廄剉芻及穀頭各自別安唯昔籠頭浪放

不繫非直飲食遂性舒適自在至於黃溺自然一處
不須掃除乾地服卧不濕不汗百匹羣行亦不鬪也

飼征馬令硬實法

細剉芻欸擲揚去葉專取剉和穀豆
秣等置槽於地雖復雪寒仍令安

廠下一日一走令其肉熟
馬則硬實而耐寒苦也

凡以猪槽飼馬以石灰泥馬槽馬汗繫著門此三事皆

令馬落駒

術曰常繫獼猴於馬坊令馬不避惡消百病故也

治馬病疫氣方

取獼尿煮以灌之獼肉及肝更良不能得肉肝只用尿耳

治馬患喉痺欲死方

經刀子露鋒刃一寸刺咽喉令潰破即愈不治必死也

治馬黑汗方

取燥馬屎置瓦上以人頭亂髮覆之火燒馬屎及髮令烟出着馬鼻下熏之使烟入

馬鼻中須
史即瘥也

又方

取猪脊引脂雄黃亂髮凡三物著馬鼻下燒之使烟入馬鼻中須史即瘥

治馬中熱方

煮大豆及熱飯
噉馬三度愈也

治馬汗凌方

取美豉一升好酒一升夏著日中冬則溫
熱浸豉使液以手搦之絞去滓以斗灌口

汗出則
愈矣

治馬疥方

用雄黃頭髮二物以臘月猪脂煎之髮
消以楷搗疥令赤及熱塗之即愈也

又方

湯洗疥拭令乾煮麵
糊熱塗之即愈也

又方

燒栢脂
塗之良

又方

研芥子塗之差六畜疥悉愈然栢濕芥子並是燥
藥其偏體患疥者宜歷落玃駁以漸塗之待瘡更

塗餘處一日之中頓
塗偏體則無不死

治馬中水方

取鹽着兩鼻中各如鷄子黃許大捉鼻令馬眼中淚出乃止良也

治馬中穀方

手捉甲上長髮向上提之令皮離肉如此數過以鉞刀子刺空中皮令突過以手當

刺孔則有如風吹人手則是穀氣耳令人溺上又以鹽塗使人立乘數十步即愈耳

又方

取錫如鷄子大打碎和草飼馬甚佳也

又方

取麥蘖末三升和穀飼馬亦良

治馬腳生附骨不治者入膝節令馬長跛方

取芥子熟搗如鷄子

黃許取芭豆三枚去皮留齊三枚亦持熟以水和令相著和時用刀子不爾破人手當附骨上拔去毛骨外融蜜蠟周而擁之不爾恐藥燥瘡大著蠟罷以藥傳骨上取生布割兩頭作三道急裹之骨小者一宿便盡大者

不過再宿然須要數看恐骨盡便傷好處看附骨盡取
冷水淨洗瘡上刮取車軸頭脂作餅子着瘡上速以淨
布急裹之三四日解去即生毛而無癢此法甚良大勝
灸者然瘡未瘥不得輒乘若瘡中出血便成大病也此
方可
治跣

治馬被刺腳方

用穰麥和小
兒哺塗即愈

治馬灸瘡

未瘥不用令汗瘡白痴時
慎風得瘥後從意騎耳

治馬瘡蹄方

以刀刺馬蹄叢
毛中使出血愈

又方

融羊脂塗瘡
上以布裹之

又方

取鹹土兩石許以水淋取一石五斗釜中煎取二
三斗剪去毛以泔清淨洗乾以鹹汁洗之三度即

愈

又方

以湯洗淨燥拭之嚼芥子塗之以布帛裹三度愈若不斷用穀塗五六度即愈

又方

剪去毛以鹽湯淨洗去如燥拭於破瓦中煮人尿令沸熱塗之即愈

又方

以鋸子割所患蹄頭前正當中斜割之令上狹下濶如鋸齒形去之如剪鬚舌向深一寸許刀子齒

令血出色必黑出五升許解放即愈

又方

先以酸泔清洗淨然後燂煮豬蹄取汁及熱洗之瘡

又方

取炊釜底湯淨洗以布拭水令盡取黍米一升作稠粥以故布廣三四寸長七八寸以粥糊布上厚

裹蹄上瘡處以散麻纏之三日去之即當瘡也

又方

耕地中拾取禾炭東倒西倒者若東西橫地取南

釜中煮取汁色黑乃止剪却毛泔水淨洗去痂以禾炭汁熱塗之一上即愈

又方

尿清羊糞令液取屋四角草就上燒令灰入鉢中研令熱用泔洗蹄以糞塗之再三愈

又方

煮酸棗根取汁淨洗訖水和酒糟毛袋盛漬蹄沒瘡處數度即瘥也

又方

淨洗了搗杏仁和猪脂塗四五上即當愈

治馬大小便不通眠起欲死須急治之不治一日即死

以脂塗人手探穀道中去結屎以鹽納溺道中須更得溺便當瘥也

治馬卒腹脹眠卧欲死方

用冷水五升鹽二觔研鹽令消以灌口中必愈

治馬發黃方

用黃栢雄黃木鼈子仁等分為末醋調塗瘡上紙貼之初見黃腫處便用針遍即塗

藥

治馬疥癬方

馬疥癬及癰瘡用川芎大黃防風全蝎各一兩荆芥穗五兩為末分作五服白湯調

之冷灌

治馬梁脊破方

成瘡不能騎坐如未破將馬腳下濕稀泥塗上乾即再易濕者三五次自消或

只用溝中青鼻泥亦可已破成瘡者用黃丹枯白礬生薑燒存性人天靈蓋燒存性各等分為末入麝香少許瘡乾用麻油調若瘡濕有膿用漿水同葱白煎湯洗淨傳之立效

治馬中結方

川山甲炒黃色大黃郁李仁各一兩風化石灰一合如無灰以朴硝代之共為末作

一服用麻油四兩醱醋一升調勻灌之立效如灌藥不通用猪牙皂角為細末同麻油各四兩和勻填薰門中再灌前藥一服即愈

常啖馬藥方

鬱金大黃甘草貝母山梔子白藥黃藥欬花黃栢黃連知母桔梗各等分為末每服

二兩以油蜜和灌子若駒則隨其大小量為加減啖後不得飲水至渴餵飼

治馬諸病方

用白鳳仙花連根葉熬成膏抹於馬眼角上汗出即愈

治馬諸瘡方

夜合花葉黃丹乾薑檳榔五倍子為末先以鹽水洗瘡後用麻油加輕粉調傅

治馬傷料方

用生蘿蔔三五個切作片子啖之效

治馬傷水方

用葱鹽油和搗作團納鼻中以手掩其鼻令氣不通良久使淚出即愈

治馬錯水方

緣馳驟喘息未定即與水飲須臾兩耳併鼻息皆冷或流冷涕即此證也先燒人亂

髮燻兩鼻後用川烏草烏白芷猪牙皂角胡椒各等分麝香少許為細末用竹筒盛藥一字吹入鼻中立效又

法葱一握鹽一兩用杵為泥罨兩鼻內須臾打通清水流出是其效也

治馬患眼方

用青鹽黃連馬牙硝麝仁各等分同研為末用蜜煎入磁瓶內盛貯點時旋取多少

以井水浸化點

治馬頰骨脹方

用羊蹄根草四十九個燒灰熨骨上冷即換之如無羊蹄根以楊柳枝如指頭

大者炙熱熨之

治馬喉腫方

螺青川芎知母川鬱金牛蒡炒薄荷貝母同為末每服二兩蜜二兩用水煎沸俟溫

調灌之

又方

取乾馬糞置瓶中以頭髮覆蓋燒烟熏其兩鼻

治馬舌硬方

用款冬花瞿麥山梔子地仙草青黛礬砂朴硝油烟墨等分為細末每用五錢許塗

舌上立瘥

治馬傷脾方

川厚朴去麤皮為末同薑棗煎灌一應脾胃有傷不食水草褰唇似笑鼻中氣短宜

速與此藥治之

治馬心熱方

甘草芒硝黃柏大黃山梔子瓜蒌為末水調灌一應心肺壅熱口鼻流血跳躑煩燥

宜急與此

藥治之

治馬肺毒方

天門冬知母貝母紫蘇芒硝黃芩甘草薄荷葉同為末飯湯入少許醋調灌療肺毒

熱極鼻中噴水

治馬肝壅方

朴硝黃連為末男子頭髮燒灰存性漿水調灌一應邪氣衝肝眼昏似睡忽然眩倒

此方主治

治馬卒熱肚脹方

用藍汁二升井花水二升或冷水和灌之立效

治馬流沫方

當歸菖蒲白朮澤瀉赤石脂枳殼厚朴加甘草為末每服一兩半酒一升葱白三握

水煎溫灌之

治馬氣喘方

玄參葶藶升麻牛蒡兜鈴黃耆知母貝母同為末每服二兩漿水調草後灌之一應

喘嗽
皆治

治馬啞喘毛焦方

用大麻子揀淨一升饅之大效

治馬結糞方

皂角燒灰存性大黃枳殼麻子仁黃連厚朴為末清米泔調灌若腸突如蔓荊子末

調同

治馬傷蹄方

大黃五靈脂木鼈子去油海桐皮甘草土黃芒藎子白芥菜子為末黃米粥和藥攤

帛上
裹之

治療馬結熱起卧戰不食水草方

黃連二兩杵末白鮮皮一兩杵末油五合

豬脂四兩細切又以溫水一升半和藥調停灌下牽行拋糞即愈

治新生小駒子瀉肚方

藁本末三錢七大麻子研汁調灌下咽喉便效次以黃連末大

麻汁

解之

治馬氣藥方

青橘皮當歸桂心大黃芍藥木通郁李仁瞿麥白芷牽牛子右件一十味各等分同

搗羅為末用溫酒調灌每匹馬藥末半兩

治馬急起卧方

取壁土多年石灰細杵羅用油酒調二兩用水灌之立效

治馬食槽內草結方

好白礬末一兩分為二服每貼和飲水後啖之不過三兩度即內消

却此法神驗

治馬腎搐方

烏藥芍藥當歸玄參山茵陳白芷山藥杏仁秦朮每服一兩酒一大升同煎溫灌隔

日再灌

治馬尿血方

黃耆烏藥芍藥山茵陳地黃堯苓枇杷為末漿水煎沸候冷調灌應卒熱尿血皆主

療之

治馬結尿方

滑石朴硝木通車前子為末每服一兩溫水調灌隔時再服結時甚則如山梔子赤

芍藥同末

治馬膈痛方

羌活白藥甜瓜子當歸沒藥芍藥為末春夏漿水加蜜秋冬小便調療膈痛低頭飢

不食草

驢騾附

說文驢似馬長耳

又騾驢父馬母也

字本作羸

何承天纂文驢一曰漢驪其子曰騾

農桑通訣驢覆馬生騾則准常以馬覆驢所生騾者形容壯大彌復勝馬然選七八歲草驢骨口正大者母長則受駒父大則子壯草驢不產產無不死養草驢常須防勿合離羣也

治驢漏蹄方

鑿厚磚石令容驢蹄深二寸許熱燒磚令熱赤削驢蹄令出漏孔以蹄頓著磚孔中


傾鹽酒醋令沸浸之牢捉勿令腳動待
磚冷然後放之即愈入水遠行悉不發

治驢打磨破潰方

馬齒菜石灰一處搗為團曬乾後復
搗羅為末先口含鹽漿水洗淨用藥

末貼
之驗

欽定授時通考卷七十



總校官庶吉士 臣侍 朝

校對官庶吉士 臣戴心亨

膳錄監生 臣徐大豐

繪圖膳錄監生 臣董椿

欽定四庫全書薈要

子部

欽定授時通考卷七十一

二



欽定四庫全書薈要卷一萬七百三十四

子部

欽定授時通考卷七十一

農餘

畜牧二

羊

爾雅羊牡羴牝羴夏羊牡羴牝羴角不齊羴角三羴羴
羴羊黃腹未成羊羴絕有力羴

疏此別羊屬也牡名羴牝名羴夏羊黑羴羴也牡名

踰牝名羖羊角不齊一長一短名觭脊捲也角捲三
匝名羴羊黃腹名羴新生未成名羴壯大有力名奮
便民圖羊者火畜也其性惡濕利居高燥作棚宜高常
除糞穢若食秋露水草則生瘡

齊民要術常留臘月正月生羔為種者上十一月二月

生者次之

非此月數生者毛必焦卷骨髓細小所以然者是逢寒遇熱故也其八九月生者雖值

秋熱比至冬暮母乳已竭春草未吐是故不佳其三四
月生者雖茂美而羔小未食常飲熱乳所以亦惡六七
月生者兩熱相仍中之尤甚十一月及二月生者母既
含重膚軀充儲草雖枯亦不羸瘦母乳適盡即得春草

是以亦佳也

大率十口一羝

羝少則不孕羝多則亂羣不孕者必瘦瘦則非惟不蕃息經冬

或羝無角者更佳

有角者喜相舐觸傷胎所由也

供厨者宜刺

刺一作刺之

刺法十餘日用布裹齒捶碎也

羊必須老人及心性宛順者起居以

時調其宜適卜式云牧民何異於是者

若使急性人及小兒者攔約不

得必有打傷之災或勞戲不看則有狼犬之害懶不驅行無肥充之理將息失所有羔死之患也

惟遠

水為良二日一飲

頻飲則傷水而鼻膿

緩驅行勿停息

息則不食而羊瘦急

行則坐塵而羊額也

春夏早放秋冬晚出

春夏氣軟所以宜早秋冬霜露所以宜晚養生

經云春夏早起與雞俱興秋冬晏起必待日先此其義也夏月盛暑須得陰涼若日中不避熱則塵汗相漸秋

冬之間必致癰疥七月以後霜氣降後必須日出霜園露晞解然後放之不爾則逢毒氣令羊口瘡腹脹也

不厭近必須與人居相連開窗向園

所以然者羊性怯弱不能禦物狼一

入園或能絕羣也

架北牆為廠

為屋即復熱熱則疥癰且屋處慣暖冬月入田尤不耐寒園

中作臺開竇無令停水二日一除勿使糞穢

穢則汚毛停水則挾

蹄眠濕則腹脹也

園內須並牆豎柴柵令周匝

羊不措土毛常自淨不豎柴者

羊措牆壁上鹹相得毛皆成羶又豎柵頭出牆者虎狼不敢踰也

羊一千口者三四月

中種大豆一頃雜穀并草留之不須鋤治八九月終刈

作青芡若不種豆穀者初草實成時刈雜草薄鋪使

乾勿令鬱泥

豈豆胡或蓬藜荆棘為上大小豆箕次之
高麗豆箕尤有所便蘆藁二種則不蘊凡

秋刈草非直為羊然大凡悉皆
倍勝崔實曰十月七日刈芻芻既至冬寒多饒風霜或

春初雨落青草未生時則須飼不宜出放積芻之法

高於

燥之處豎桑棘木作兩圓柵各五六步許積芻柵中
高一丈亦無嫌任羊遠柵指食竟日通夜口常不住終
冬過春無不肥充若不作柵假有千車芻擲與十
口羊亦不得飽羣羊踐躅而已不得一莖入口不收

芻者初冬乘秋似如有膚羊羔乳食其母比至正月母

皆瘦死羔小未能獨食水草尋亦俱死非直不滋息或

減羣斷種矣

余昔有羊二百口芻豆既少無以飼一歲
之中餓死過半假有在者疥瘦羸斃與死

不殊毛復短淺全無潤澤余初謂家自不宜又疑歲道
疫病乃飢餓所致無他故也人家八月收穫之始多無
膚假且買羊雇人所費既少所存者大傳曰三折臂始
為良醫又曰亡羊治牢未為晚也世事畧皆如此安可
不存意哉寒月生者須然火於其邊夜不然火必凍死凡初產者宜

煮穀豆飼之白羊留母二三日即母子俱放

白羊性狠不得獨留

并母久住則令乳之殺羊但留母一日寒月者內羔子坑中日父

母還而出之

坑中煖不苦風寒地熱使眠如常飽者也

十五日後方喫草乃

放之白羊三月得草力毛牀動則鉸之

鉸訖於河水之中淨洗羊則生

白淨之毛也五月毛牀將落鉸取之

鉸訖更洗如前

八月初胡菓子

未成時又鉸之

鉸了亦洗如初其八月半後鉸者勿洗白露已降寒氣侵人洗即不益胡藁子

成然後鉸者匪直着毛難治又歲稍晚比至寒時毛長不足令羊瘦損漠北塞之羊則八月不鉸鉸則不耐寒中國必須鉸不鉸則毛長相著作鹽難成也

便民圖棧羊法向九月初買腓裼羊多則成百少則不

過數十羝初來時與細切乾草少著糟米拌經五七日

後漸次加磨破黑豆稠糟水拌之每羊少飼不可多與

與多則不食可惜草料又兼不得肥勿與水與水則退

腓裼多可一日六七次上草不可太飽則有傷少則不

飽不飽則退膝欄圈常要潔淨一年之中勿餵青草餵之則減膝破腹不肯食枯草矣

家政法養羊法當以瓦器盛一升鹽懸羊欄羊喜鹽自數還啖之不勞人收又羊有病輒相污欲令別病法當欄前作瀆深二尺廣四尺往還皆跳過者無病不能過者入瀆中行過便別之

龍魚河圖羊有一角食之殺人

農政全書牧養須已出未入不使沾星露之草則無耗

羊一羣擇其肱而大者而立之主一出入使之倡先
或圍於魚塘之岸草糞則每早掃於塘中以飼草魚而
羊之糞又可飼鯉魚一舉三得矣露草上有綠色小蜘蛛
羊食之即死故不宜早放

作氊法

春毛秋毛中半和用秋毛緊強春毛軟弱獨用太偏是以須雜三月桃花水氊第一凡作氊不

須厚大唯緊薄均調乃佳耳二年數卧小覺垢以九月十月賣作氊氊明年四五月出氊時更買新者此為長存不穿敗若不數換非直垢汙穿冗之後便無所直虛成糜費此不朽之功豈可同年而語也

令氊不生蟲法

夏月數席不卧上則不生蟲若氊多無人卧上者預收權柴燥灰入五月中羅

灰徧著壇上厚五寸許卷束於風涼之處閣置蟲亦不生如其不爾無不生蟲

羝羊四月末五月初鉸之

性不耐寒早鉸寒則凍死雙生者多易為孳息性既豐乳

有酥酪之饒毛堪酒袋兼繩索之利其潤益又過於白羊也

羊有疥者間別之不別相染汚或能合羣致死羊疥先著者難治多死

治羊疥方

取藜蘆根咬咀令破以泔浸之以瓶盛塞口於竈邊常令煖數日醋香便中用以磚瓦刮

疥令赤若強硬痂厚者亦可以湯洗之去痂拭燥以藥汁塗之再上愈若多者日別漸漸塗之勿頓塗令徧羊皮不堪藥勢便死矣

又方

去茄如前洗燒葵根為灰煮醋澱熱塗之以灰厚傳再上愈寒時勿剪毛去即凍死矣

又方

臘月豬脂加熏黃塗之即愈

羊膿鼻眼不淨者皆以中水治方

以湯和鹽用杓研之極膩塗之為佳更待

冷接取清以小角受一鷄子者溝兩鼻各一角非直水瘡永息天蟲五日後必飲以眼鼻淨為候不瘡更溝一法如前

羊膿鼻口頰生瘡如乾癬者名曰可妬運迭相染易著

者多死或能絕羣治之方

豎長竿於園中竿頭施橫板令獼猴上居數日自然差此

獸避惡常安於園中亦好

治羊挾蹄方

取羝脂和鹽煎使熟燒熱令微赤著脂烙之著乾勿令水汎入七日自然瘡耳

凡羊經疥得差者至夏後初肥時宜賣易之不爾後年

春疥發必死矣

治羊火蹄方

以殺羊脂煎熟去滓取鐵篋子燒熱將脂勻塗篋上烙之勿令入水次日即愈

豕

爾雅豕子豬獮獮幺幼奏者羴豕生三縱二師一持所寢槽四獮皆白亥其跡刻絕有力豨牝豨

䟽此辨豕之種類也其子名豬獮一名獮謂獮捷豬

也幺幼豕之最後生者名也皮理腠感者名羴三縱
二師一特郭云豬生子常多故別其少者之名豬卧
處名槽四蹄皆白名穠其跡名刻絕有力名𧣾豕之
牝者名𧣾

方言北燕朝鮮之間謂之𧣾關東西或謂之𧣾或謂之
豕南楚謂之𧣾其子或謂之豚或謂之𧣾吳揚之間謂
之豬子

齊民要術母豬取𧣾喙無柔毛者良

喙長則牙多三牙
以上則不煩畜為

難肥故有柔牝者子母不同圈子母一同意聚不牡者
毛治難淨也

同圈則無嫌圈不厭小圈小肥疾處不厭穢泥穢得亦須小

廠以避雨雪春夏中生隨時放牧糟糠之屬當日別與

八九十月放而不飼所有糟糠則畜待冬春初猪性甚

之草把取水藻等近岸猪食之皆肥初產者宜煮穀飼之其子三日掐尾

六十日後捷三日則不畏風凡死者皆尾風所致耳捷

者骨麤肉少如捷牛十二月子生者豚一宿蒸之蒸法索籠

盛腦凍不合出旬便死所以然者豚性腦少寒盛則供

食豚乳下者佳簡取別飼之愁其不肥共母圈粟豆難足宜埋車輪為食場散粟豆於內小豚足食出入自由則肥速

農桑通訣江南水地多湖泊取近水諸物可以飼猪凡占山皆用橡食藥苗謂之山猪其肉為上江北陸地可種當約量多寡計畝數種之易活耐寒割之比終一畝其初已茂用之漸切以泔糟等水浸於大檻中令酸黃或拌麩糠雜飼之特為省力易得肥脂前後分別歲歲

可鬻足供家費

四時類要閹豬了待瘡口乾平復後取巴豆兩粒去殼爛搗和麻粳糟糠之類飼之半日後當大瀉其後日見肥大

農政全書猪多總設一大圈細分為小圈每小圈止容一猪使不得閹轉則易長也肥猪法用管仲三觔蒼朮四兩黃豆一斗芝麻一升各炒熟共為末餌之十二日則肥

肥猪法

麻子二升搗十餘杵鹽一升同煮和糠三升飼之立肥

治猪病法

割去尾尖出血即愈若瘟疫用蘿蔔或及梓樹華與食之不食難救

犬

爾雅犬生三獫二師一獬未成毫狗長喙獫短喙獨獫絕有力桃彪狗也

疏此別狗屬也犬生三子則曰獫二曰師一曰獬毫是幹毛犬子未生幹毛者名狗喙口也長口者名獫短口者名獨獫壯大絕有力者名桃彪即狗也

便民圖凡人家勿養高腳狗彼多喜上桌橈竈上養矮
腳者便益純白者能為怪勿畜之凡黑犬四足白者凶
後二足白頭黃者吉足黃招財尾白者大吉一足白者
益家白犬黃頭吉背白者害人帶虎斑者吉黃犬前二
足白者吉胸白者吉口黑者招官事四足俱白者凶青
犬黃耳者吉犬生三子俱黃四子俱白八子俱黃五子
六子俱青吉

治狗病方

用水調平胃散灌之
加赤殼巴豆尤妙

治狗卒死方

用葵根塞鼻內即活

治狗癩方

狗遍身膿瘡用百部濃煎汁塗之狗蠅多者以香油遍身擦之立去

猫

附

便民圖猫兒身短最為良眼用金銀尾用長面似虎威聲要噉老鼠聞之自避藏露爪能翻瓦腰長會走家而長鷄絕種尾大懶如蛇又法口中三坎者捉一季五坎者捉二季七坎捉三季九坎捉四季花朝口咬頭牲耳薄不畏寒毛色純白純黑純黃者不須揀若看花猫身

上有花又要四足及尾花纏得過者方好

治猫病方

凡猫病用烏藥磨水灌之若喂火疲悴用硫黃少許入猪湯中炮熟喂之或入魚湯中餵

之亦可小猫誤被人踏死用

蘇木濃煎湯濾去粗灌之

鵝鴨

爾雅舒雁鵝

註禮記日出如舒雁今江東呼為鴨疏李巡曰野曰

雁家曰鵝

又舒鳬鶩

註鴨也疏李巡曰野曰鳧家曰鴨

又鳧雁醜其足蹠

註腳指間有幕蹠屬相著

齊民要術鵝鴨并一歲再伏者為種

一伏者待時少三伏者冬寒雖亦多

死也故取再伏

大率鵝三雌一雄鴨五雌一雄鵝初輩生子十

餘鴨生數十後輩皆漸少矣

嘗足五穀飼之生子多不足者生子少

欲放

廠屋之下作窠

以防猪犬狐狸驚恐之害

多著細草於窠中令煖先

刻白木為卵形窠別著一枚以誑之

不爾不肯入窠東西浪生若獨著窠

後有爭窠之患也

生時尋即收取別作一煖處以柔細草覆之

停置窠中凍即湏死

伏時大鵝一十子大鴨二十子小者減之

多則

不數起者不任為種

數起則凍死也

其貪伏不起者須五六日

一與食起之令洗浴

久不起者飢羸身冷雖伏無熱

鵝鴨皆一月雛出

量雛欲出時四五日內不用聞打鼓紡車犬叫猪犬及

春聲又不用器淋灰不用輕見產婦

觸忌者雛多厭殺不能自出假令出

亦尋死也

雛既出別作籠籠之先以粳米為粥糜一頓飽食

之名曰填嗉

不爾喜軒壺先量而死

然後以粟飯切苦菜蕪菁英

為食以清水與之濁則易

不易歷塞鼻則死

入水中不用停久

尋宜驅出

此既水禽不得水則死臍未合久在水中冷徹亦死

於籠中高處敷細

草令寢處其上

雖小臍未合不欲冷也

十五日後乃出

早放者匪直乏力致

又有寒冷燕鵠災也

鵠惟食五穀稗子草菜不食生蟲

葛洪方日居躬

工之地常養鵠見此物食之故驚羣此物也

鴨靡不食矣水稗成實時尤是

所便噉此足得肥充供厨者子鵠百日以外子鴨六七

十日佳過此肉硬大率鵠鴨六年以上老不復生伏矣

宜去之少者初生伏又未能工惟數年之中乃佳耳

風土記鴨春季雛到夏五月則任啖故俗五六月則烹食之

便民圖凡相鵝鴨母其頭欲小口上齧有小珠滿五者生卵多滿三者為次

棧鵝易肥法稻子或小米大麥不計煮熟先用磚蓋成小屋放鵝在內勿令轉側門中木棒簽定

只令出頭喫食日餵三四次夜多與食勿令住口得去尾際糞衣如此三日如肥一觔

養雌鴨法每年五月五日不得放棲只乾餵不得與水則日日生卵不然或生或不生土硫黃飼之

肥易

作杙子法純取雌鴨無令雜雄足其粟豆常令肥飽一

鴨便生百卵

俗所謂谷生者此卵既非陰陽合生雖伏亦不成雖宜以供贍杙木皮爾雅

曰杙魚毒郭璞注曰杙大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵黑無杙皮者虎杖根並作用爾雅曰茶虎杖郭

璞注云似紅草大有細刺可染赤

淨洗細莖剉煮取汁二斗及熟下鹽

一升和之汁極冷內甕中

熱則卵敗不堪久停浸鴨子一月煮食

鹹徹則卵浮

吳中多作者至十數斛久停彌善亦得經夏也

雞

爾雅雞大者蜀蜀子雞未成雞健絕有力奮

疏此別雞屬也雞者知時畜其大者名蜀蜀之雛子

名雛雛之稍長未成鷄者名健壯大絕有力者名奮

齊民要術雞種取桑落時生者良

形小淺毛腳細短是也守窠少聲則無子

春夏生者則不佳

形大毛羽悅澤腳麓長者是游蕩饒聲產孔易厭既不守窠則無緣蕃息

也鷄春夏雛二十日內無令出窠飼以燥飯

出窠早不免鳥鵠與

濕飯則令臍濃

雞棲宜掘地為籠內著棧雖鳴聲不朗而安穩

易肥又免狐狸之患若任之樹林一遇風寒大者損瘦

小者或死燃柳柴雞雛小者死大者盲家政法養鷄法

二月先耕一畝作田秫粥灑之刈生茅覆上自生白蟲
便買黃雌雞一隻雄一隻於地上作屋方廣丈五於屋
下懸簣令雞宿上并作雞籠懸中夏月盛晝雞當還屋
下息并於園中築作小屋覆雞養子烏不得就

龍魚河圖畜雞白頭食之病人雞有六指者亦殺人鷄
有五色者亦殺人

養生論雞肉不可食小兒食令生疣蟲又令消體瘦鼠
肉味甘無毒令小兒消殺除寒熱炙食之良也

農政全書或設一大園四圍築牆中築垣分為兩所凡
兩園牆下東西南北各置四大雞棲以為休息每一旬
撥粥於園之左地覆以草二日盡化為蟲園右亦然俟
左盡即驅之右如此代易則雞自肥而生卵不絕若遇
瘟疫傳染即湏以籃盛雞叉口懸掛或移於樓閣上即
免矣

養雞令速肥不杞屋不暴園不畏烏鴟狐狸法

別築牆
匡開小

門作小廠令雞閉兩目雌雄皆斬去六翮無令得飛出
園多收桃稗胡之類以養之亦作小槽以貯水荊藩為

樓去地一尺數掃去屎鑿牆為窠亦去地一尺惟冬天著草不如則子凍春夏秋三時則不須直置匡上任其產伏留草則蜚虫生雞出則著外許以罩籠之鵪鶉大還內牆匡中其供食者又別作牆匡蒸小麥飼之三七日便肥大矣

又穀產雞子供常食法

別取雌雄勿令與雌雄相雜牆匡斬翅荆樓土窠一法惟多與

穀食之令竟冬肥盛自然穀產雞子矣一雞滋生至百餘卵不雜並食之無咎餅炙所須皆宜用此也

瀾雞子法

打破著沸湯中浮出即掠取生熟正得即加鹽醋也

炒雞子法

打破銅鑊中攪令黃白相雜細擘蔥白下鹽末渾豉麻油炒之甚香美

棧雞易肥法

以油和麵捻成指尖大塊日與數十枚食之又以做成硬飯同土硫黃研細每次與

五分許同飯拌
勻餵數日即肥

養雞不抱法

母雞下卵時日逐食肉夾以
麻子餵之則常生卵不抱

養生雞法

雞初來時即以淨溫
水洗其足自然不走

治雞病方

凡雞雜病以真麻油灌之皆立
愈若中蜈蚣毒則研茱萸解之

治鬪雞病方

以雄黃末搜飯飼之可去其胃
蟲此藥性熱又可使其力健

魚

陶朱公養魚經治生之法有五水畜第一水畜魚也以
六畝地為池池中有九州求懷子鯉魚長三尺者二十

頭牡鯉魚長三尺者四頭以二月上庚日內池中令水
無聲魚必生至四月內一神守六月內二神守八月內
三神守神守者鰲也內鰲則魚不復飛去在池中周遶
九州無窮自謂游江湖也至來年二月得魚長一尺者
一萬五千三尺者五千枚二尺者萬枚直五千得錢一
百二十五萬至明年一尺者十萬枚二尺者五萬枚三
尺者五萬枚長四尺者四萬枚留長二尺者二十枚作
種所餘皆賣得錢五百一十萬候至明年不可勝計所

以養鯉魚者不相食易長不費也

農桑通訣凡育魚之所須擇泥土肥沃蘋藻繁盛為上然必召居人築舍守之仍多方設法以防獺害凡所居近數畝之湖如依陶朱法畜之可致速富今人但上江販魚取種塘內畜之飼以青蔬歲可及尺以供食用亦為便法

農圃四書魚種古法俱求懷子鯉魚納之池中但自涵育或在取近江湖藪澤陂泖水際之土數舟布底則二

年之內土中自有大魚宿子得水即生也今之俗惟購魚秧其秧也漁人汎大江乘潮而布網取之者初也如針鋒然乃飼之以鷄鴨之卵黃或大麥之麩屑或炒大豆之末稍大則鬻魚池養之家閩錄云仲春取子於江曰魚苗畜於小池稍大入葦塘曰葦鯪可尺計徙之廣池飼以草九月乃取有難長之秧曰艍艘其首黃色曰螺師青以其食螺師也故名爾雅翼曰鱖魚螺蚌是也其口尖期年而鼻竅始通不得通則死長至尺許乃易

大惟鯪魚為良其口潤而盆首似鯉而身圓謂之草魚
食草而易長爾雅翼曰鯪魚食草白鯪乃魚之貴者白
露左右始可納之池中或前一月或後一月皆不育漁
人攜於舟若煎炙油氣觸之則目皆瞎京口錄曰巨首
細鱗池塘中多畜之鯪魚松之人於潮泥地鑿仲春潮
水中捕盈寸者養之秋而盈尺腹背皆腴為池魚之最
是食泥與百藥無忌京口錄云頭匾而骨軟閩志云目
赤而身圓口小而鱗黑吳王論魚以鯪為上也其魚至

冬能牽被而自藏

又凡鑿池養魚必以二有三善焉可以蓄水留時可去大而存小可以解汎

此池汎可入彼池

不可以漚麻一日即汎

魚遭鵠糞則汎以圉糞解之魚之自糞多而返復食之則汎亦以圉糞解之池不宜太深深則水寒而難長魚食雞鴨卵之黃則中寒而不予故魚秧皆不予魚之行遊晝夜不息有洲島環轉則易長池之傍樹以芭蕉則滴露而可以解汎樹棟木則落子池中可以飽魚樹葡萄

荀架子於上可以免鳥糞種芙蓉岸周可以辟水獺魚
食楊花則病亦以糞解之食蟋蟀嫩草食稗子池之正
北後宜特深魚必聚焉則三面有日而易長飼之草亦
宜此方一日而兩番須有定時魚小時草必細食至冬
則不食凡魚嘯子必沿水痕雖乾涸十年遇水即生其
長甚易其嘯子也以五月鯉魚以五月下惟銀魚鱸殘
魚嘯子於冰水解三日乃生也飼魚不可撩水草恐有
黑魚鮎魚等子在草上是能食魚黑魚者鱧魚也夜則

仰首而戴斗鮎魚者鰱魚也即鯢魚也大首方口背青黑而無鱗是多涎池中不可著碱水石灰能令魚汎凡池之蘇相傳一夜生七子太密則魚皆鬱死必去其半乃佳

便民圖凡魚遭毒翻白急疏去毒水別引新水入池多取芭蕉葉搗碎置新水來處使吸之則解或以溺澆池面亦佳

農政全書江西養魚法掘小池方一丈深八尺底又作

小池方五尺深二尺用杵築實蓄水至清明前後出時
買鯪魚鯪魚苗長一寸上下者每池鯪六百鯪二百每
日以水荇帶草喂之無草時可用鹹蛋殼與食之常時
積下至時用之冬月尤宜用之令魚并泥食之不散游
至五月五日後五更時用夏布袱於塘近邊釘四椿張
布袱其上次以夏布兜撈魚苗傾袱內選去雜魚另置
一水盆中其鯪鯪入水桶旋送入中池中池方二三丈
每池可放七八百池中生栽荇草栽法於二三月舊魚

入大塘去水曬半乾栽苐草於內栽完放水長草以養
新魚其中池移過大池之鯽魚每百日用草二擔則中
池過塘時魚重一觔者至十月可得三四觔大塘者大
小為魚多寡水宜深五尺以上每食魚只於大塘內取
之中塘苐草盡再入之或用正本草若大池面方二三
十步以上者可得三四觔以上魚即與老草連根食之
刮苐麻取下葉以席蓋之勿曬乾至晚入池中當夜食
盡又冬月大魚無食有一法常時積舊草薦置僻處使

人溺其上久之至冬月剉細以稻泥或黃土和草成碗
大團子曬乾置池中心深處大魚則并泥食之中池中
魚剉草宜更細入水二三日和土成團冬月塘乾取起
魚寄別處池內或入大桶速乾水起生泥壅池生泥只
取爛泥勿取乾者池瘦傷魚令生虱取過泥速栽荇草
放水入魚魚虱如小豆大似團魚凡山中暴雨入池帶
惡蟲蛇氣亦令魚生虱則極瘦凡取魚見魚瘦宜細檢
視之有則以松毛遍池中浮之則除凡小池宜在大池

之旁以便冬月寄魚小池過小魚於中中池即栽荇
又作羊棬於塘岸上安羊每早掃其糞於塘中以飼草
魚而草魚之糞又可以飼鯽魚如是可以省人打草但
魚畧有微滯耳水畜之利須擇背山面湖山聚水曲之
處起造住宅先置田地山場凡僕從即便播穀種蔬樹
植蠶繅以為衣食之源然後掘築方圍大塘以收水利
塘內有九州八谷如同江湖納蝦鰲螺螭為神守使魚
相忘若自以為江湖之中日夜游戲而不息矣

蜜蜂附

農桑通訣人家多於山野古窠中收取蜂蜜蓋小房或
編荆圉兩頭泥封開一二小竅使通出入另開一小門
泥封時時開却掃除常淨不令他物所侵及於家院掃
除蛛網及闕防山蜂土蜂不使相傷秋花彫盡留冬月
可食蜜脾餘者割取作蜜蠟至春三月掃除如前常於
蜂窠前置水一器不致渴損春月蜂盛一窠止留一王
其餘摘之其有蜂王分窠羣蜂飛去用碎土撒而收之

別置一窠其蜂即止春夏合蜜及蠟每窠可得大絹一疋有收養生息分百窠者不必他求而可致富也

經世民事十月割蜜天氣漸寒百花已盡宜開蜂窠後門用艾燒烟微薰其蜂自然飛向前去若怕蜂蟄用薄荷葉嚼細塗在手面其蜂自然不蟄或用紗帛蒙頭及身上截或皮套五指尤妙約量冬至春其蜂食之餘者揀大蜜脾用利刀割下却封其窠將蜜絞淨不見火者為白沙蜜見火者為紫蜜入窠盛頓將絞下蜜粗入鍋

內慢火煎熬候融化拗出絞粗再熬預先安排錫鏟或瓦盆各盛冷水次傾蠟水在內凝定自成黃蠟以粗內蠟盡為度要知其年收蜜多寡則看當年雨水何如若雨水調勻花木茂盛其蜜必多若雨水少花木稀其蜜必少或蜜不敷蜜蜂食用宜以草鷄或一隻或二隻退毛不用肚腸懸掛窠內其蜂自然食之又力倍常至春來二月門開其封止存雞骨而已

農政全書冬月割蜜過多則蜂飢飢時可將嫩雞白煮

置房側令食之

欽定授時通考卷七十一